

# 快用手机买体彩吧

## 不仅方便, 还有红包相送

看到别人中奖也会止不住心痒?想买彩票总要跑腿又感觉好麻烦?闲暇无聊时想找点乐事打发一下时间?……我们懂你的烦恼,也帮你想了个妙招,送你一个买彩神器——山东体彩推出的“手机在线”,有了它,让你躺在家里也能买彩票,动动手指就能中奖!

悄悄告诉你,“手机在线”目前还有福利放送噢,1500万红包大派送活动还在持续进行,注册送20元红包,充值100就送50元红包,如此美事怎能错过?更何况大乐透还在开展5亿元大派送活动,用“手机在线”,领红包、分享派奖奖金一个都不能少!很多新加入的小伙伴还不知道怎么来操作,没关系,以下5步助您轻松开启“手机在线”美妙之旅!

**第一步:扫描二维码**  
用户首次扫描二维码,下载“手机在线”,就可以参与红包活动。

**第二步:下载安装**  
“手机在线”有安卓和IOS两个版本,用户可根据系统提示逐步安装即可。

**第三步:注册账户**  
用户根据提示输入用户名、密码进行登录账号注册;根据系统提示输入真实姓名、身份证号码、手机号码等信息,验证通过后投注账户开通。

**第四步:充值**  
目前您可通过储蓄卡快捷支付进行充值,同时可以通过建设银行的网银、电话银行、手机银行等进行充值。

**第五步:投注**  
用户登录手机客户端,选择具体游戏,按界面提示选择游戏,点击“立即投注”。目前开售的游戏涵盖竞猜型、即开型、乐透型共19款游戏,选择心仪的游戏就可以投注赢大奖了。



# 秋季蔬菜水肥管理至关重要

农村大众记者 张超

问:番茄生长过于旺盛,怎么办?

刘天英:一般来说营养生长是生殖生长的物质基础和能量基础,但营养生长过旺,对生殖生长也不利。因为在这种情况下,有机物大部分被营养生长所消耗,生殖生长就得不到足够的有机养料。

针对这个时期的番茄生长过于旺盛,菜农可适时适量整枝打叶,搭架,使通风透气良好,并用生长调节剂如防落素喷花,促进坐果,抑制过度营养生长。及时进行通风,植株缓苗后,在保持一定温度下,要大胆放风,降低棚内湿度。一开始开花坐果,就要下裙膜放底风,夜间外界最低温不低于15℃,昼夜都要通风。

控制水肥,一般在开花坐果前

不要施肥水,特别是采用了地膜覆盖的,在坐稳果后,才开始视情况适量追肥。控制氮肥用量,多施钾肥和磷肥。

问:秋季大葱应该怎么进行田间管理?

刘天英:秋季大葱田间管理的中心是促根、壮棵和培土软化,加强水肥管理,为葱白的形成创造适宜的环境条件,从而提高大葱的产量和品质。

大葱对水肥条件的要求比较高,立秋至白露之间,灌水应掌握轻浇、早晚浇水的原则。白露以后大葱进入生长盛期,灌水应掌握勤浇、重浇的原则。每隔4-6天浇1次水。霜降以后气温降低,大葱基本长成,需水量减少,要保持土壤湿润。收获前5-7天停止浇水,有利

于收获储运。

大葱在施足基肥的基础上还要分期追肥。立秋以后植株生长加快时,追施“攻叶肥”,每亩施钙肥和磷肥20-25斤,促进叶部增长。白露节后进葱白生长盛期,是大葱产量形成的关键时期,应结合浇水追肥两次,每次每亩施尿素15公斤、钾肥15公斤,追施于行间,浅中耕后浇水。

问:秋季适合种植大棚芹菜吗?种植时需要注意哪些事项?

刘天英:芹菜属于绿叶菜类速生的蔬菜,它的适应能力非常强,大棚芹菜一般情况下是在夏季进行育苗,在秋季进行定植。现在种植,需要抓紧育苗。

大棚芹菜大多采用干籽播种,

也可以采用催芽播种。在苗床上要浇足底水,要趁水没有完全渗干的时候用细土把苗床进行平整,将种子均匀的播撒在苗床的床面。大棚芹菜在播种之后要覆盖遮光防雨的设备,在芹菜出苗之后可以逐渐地减少遮阴的时间,增加光照的时间。而且苗床要进行经常性的洒水,当芹菜的幼苗长到有4-6叶时,要进行适当的控水,及时防治虫害和病毒的侵入,防治芹菜在幼苗的时候得猝倒病。

在大棚芹菜起苗之前要把苗床浇透水,这样会有利于芹菜幼苗连根拔起,按照幼苗的大小把芹菜的幼苗进行分级和分畦栽植,而且要进行单株定植,栽植的深度也要合适,栽植完成之后要立即浇定植水。

# 今年棉花成熟晚 正确使用乙烯利

我国南北棉区,在正常年份,纯作春棉一般在8月下旬到9月上旬进入吐絮成熟期。今年我国南北区的棉花,由于棉花生长的中期,受高温多雨的影响,蕾铃脱落重,伏桃坐结少;后期气温偏高,光照好,多数棉田都实现了秋桃盖顶,秋桃所占比例达一半左右,致使棉花成熟期较常年推迟7-10天。据笔者近期田间调查,纯作春棉的吐絮株只有9-16%;套种的春棉,仅有个别植株开始吐絮。因此,今年棉田的后期管理,搞好催熟工作尤为重要。



多年的实践表明,晚熟棉田正确使用乙烯利催熟,是一项简便易行、增产增收的好措施。晚熟棉花,通过喷施乙烯利,能提早吐絮7-10天,霜前花率增加10%-20%,增产6.4%-10.2%,每亩可增收70-120元。而且催熟的棉田,可以提早拔柴,有利于小麦等下茬作物适期播种和产量的提高。但乙烯利是一把“双刃剑”,如果使用不当,不但不增产增收,反而造成减产减收。因此,必须正确掌握乙烯利的使用技术,做到科学使用,才能达到增产增收。

**选择适宜施药棉田。**要选择贪青晚熟和后发性较强的棉田,重点是套种田、夏播棉、及后发性强的杂交春棉。对有80%以上的棉铃铃期在40-45天的棉田,施药的效果会特别好。但是,对于发育正常成

熟的棉田,特别是有早衰趋势的棉田,不能喷施乙烯利,否则引起棉株过早枯萎,而造成减产减收。对良种繁育田的棉花,更不能喷施乙烯利,如果喷施,会使种子的利用价值大大降低。

**正确掌握施药的适宜时期。**喷施乙烯利的效果如何,与温度密切相关。因乙烯利必须在气温20℃以上时,才能分解释放乙烯。所以棉田喷药后,要求日最高气温在20℃以上的时间能有15天左右,才能收到良好的效果。根据这一原则,我国北方棉区喷药时间,主要参考除霜期,宜在初霜期前的20天;在南方棉区的喷药时间,主要根据主体棉铃的铃期及拔秆期限,一般在拔秆前的15-20天为宜。一般年份,和一般情况下,我国黄淮地区,宜在10月5日前后喷施;长江流域棉区,宜在10月15日-20日喷药。具

体喷药时间的确定,还应因地制宜灵活掌握。

**喷施方法和用药量:**要选择无风、或微风的晴天,上午9时至下午3时的气温较高,此时喷药效果好。农药的用量,要依据棉花的长势,当时的温度和喷药的时期早晚而定。对于长势旺,施药时期较晚,气温较低,以及急于腾茬的棉田,施药量要适当增加,但每亩的施药量不能超过200毫升;反之,施药量要适当减少。在黄淮地区,10月初施药的,每亩用40%乙烯利100毫升,对水50公斤,稀释均匀后喷施;若在10月上旬末至中旬初施药,每亩需用药150毫升,对水60公斤,稀释均匀后喷施。将稀释后的药液对准植株铃期40天以上的青铃,自上而下均匀喷洒,使每个需要催熟的棉铃都粘满药液。

喷施乙烯利与2%过磷酸钙混合液。棉花后期喷施2%过磷酸钙稀液,有促早熟、防早衰,增产、增收显著等作用,一般可增产5%以上。因过磷酸钙属酸性化肥,与酸性的乙烯利混合使用,不但不影响乙烯利的药效,而且还能起到增效作用,值得因地制宜的推广。其方法:先将1公斤优质的过磷酸钙,用50-60公斤的清水化开,滤去残渣,然后加入每亩所需的烯利农药,混合均匀后即可喷施一亩地。

**使用乙烯利需要注意的几个问题:**1、乙烯利属酸性农药,遇到碱性物质易分解失效。因此,千万不能与碱性农药混合使用。配制好的乙烯利稀液,不宜存放,要做到随配制随使用。2、棉田喷施乙烯利后,若在6小时内降雨,雨过后需要重新喷药。3、施药之前,应将吐絮的棉铃采收,以免喷药引起絮棉品质下降。4、乙烯利原液为强酸性,对人体有较强的刺激作用,工作时要做好安全保护。皮肤粘上药液时,立即用肥皂和清水冲洗干净。5、不要偏听偏信、图便宜,而购买伪劣药品。近來市场上,出现了不少形形色色棉花催熟剂产品,这些产品大都是未经农业部批准登记,属于不能使用的伪劣产品。棉农应通过正规渠道,购买正规厂家的产品。

(贾登三)

(甘肃)

# 梨得黑星病怎样来防治



梨黑星病又称疮痂病,是梨树上的一种主要病害。能危害所有幼嫩的绿色组织,以果实和叶片为主。果实发病初生淡黄色圆形斑点,逐渐扩大病部稍凹陷,上长黑霉,后病斑木栓化,坚硬、凹陷并龟裂。幼果受害为畸形果,成长期果实发病不畸形,但有木栓化的黑星斑。叶片受害,初在叶背主、支

脉之间呈圆形、椭圆形或不规则形的淡黄色斑,或沿叶脉扩展形成黑霉斑,严重时,整个叶片布满黑色霉层。叶柄、果梗症状相似,出现黑色椭圆形的凹陷斑,病部覆盖黑霉,萎缩,失水干枯,致叶片或果实早落。

**防治方法:**1、消灭病菌侵染来源。清扫落叶落果,早春梨树发芽前结合修剪清除病梢、叶片及果实加以烧毁,也可在发病初期摘除病梢或病花丛。2、加强果园管理。梨树生长衰弱,易被病菌侵染,因此增施肥料特别是有机肥,可增强树势,提高抗病力。3、喷药保护。在南方梨黑星病发生较早,应在梨树接近开花前和落花70%左右各喷一次药,以保护花序、嫩叶和新叶,以后根据降雨情况,每隔15-20天喷药一次,先后共4次。1:2:200倍式波尔多液或30%绿得保胶悬剂300-500倍或25%多菌灵可湿性粉剂250倍液。(窦青林)

**健康肥料 祥云智造**

湖北祥云(集团)化工股份有限公司 地址:湖北省武穴市盘塘 客服热线:400-888-0696

HUBEI XIANYUN (GROUP) CHEMICAL CO., LTD 网址: www.xychem.cn